



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๓๖๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำแนะนำการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasiil™) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๓๑๘๖
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasiil™) ที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยวัคซีนโรต้าแบบหยอด ๒ ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “Rotarix™” และวัคซีนแบบหยอด ๓ ครั้ง ได้แก่วัคซีน “Rotasiil™” โดยวัคซีน “Rotarix™” คาดว่าจะกระจายได้ถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด จากนั้นจะกระจายวัคซีน “Rotasiil™” ทดแทน

จังหวัดแพร่ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่ที่มีหน่วยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด ถือปฏิบัติตามคำแนะนำการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasiil™) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

4



ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๓๑๘๖

จังหวัดแพร่
เลขรับ... 7777
วันที่... 22 ก.ค. 2568
เวลา... 16.30 น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำแนะนำการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (RotasiiTM) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๗๘๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้แจ้งคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (RotasiiTM) ที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยวัคซีนโรต้าแบบหยอด ๒ ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “RotarixTM” และวัคซีนแบบหยอด ๓ ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “rotasiiTM” โดยวัคซีน “RotarixTM” คาดว่าจะกระจายได้ถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ หรือจนกว่าวัคซีนจนหมด จากนั้นจะกระจายวัคซีน “rotasiiTM” ทดแทน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการให้บริการวัคซีนโรต้า ภายใต้มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/jmJuV> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏฐ์ ศรีวงศ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนารักษ์ สองแก้ว โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๓๐.๘/ว ๗๔๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 34020
วันที่ - 3 ก.ค. 2568
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasil™) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasil™) ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วัคซีนโรต้าที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วยวัคซีนโรต้าแบบหยอด ๒ ครั้ง ได้แก่ วัคซีน "Rotarix™" และวัคซีนโรต้าแบบหยอด ๓ ครั้ง ได้แก่ วัคซีน "Rotasil™" โดยวัคซีน "Rotarix™" คาดว่าจะกระจายได้ถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด จากนั้นจะกระจายวัคซีน "Rotasil™" ทดแทน

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโรต้าได้อย่างทั่วถึง และหน่วยบริการสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรแจ้งคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasil™) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินงานให้บริการวัคซีนโรต้าของหน่วยบริการในพื้นที่ภายใต้มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดของท่าน ได้รับทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๐๗๐๒๐

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ 2989
- 4 ก.ค. 2568
เวลา

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗

โทรสาร -

คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรต้า (Rotasil™)
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2568

กองโรคติดต่อทั่วไป
มิถุนายน 2568

วัคซีนโรต้าที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยทั้งวัคซีนโรต้าแบบหยอด 2 ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “Rotarix” ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์ G1P[8] ผลิตโดยบริษัท Glaxosmithkline Biologicals S.A. และนำเข้าโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และวัคซีนชนิดแบบหยอด 3 ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “ROTASIL” ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์ G1, G2, G3, G4 และ G9 ผลิตโดยบริษัท SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD. และนำเข้าโดยบริษัท มาสุ จำกัด โดยคาดว่า วัคซีน “Rotarix” จะกระจายจนถึงช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2568 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด จากนั้นจึงจะกระจายวัคซีน “Rotasil” ทดแทน ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโรต้าโดยสรุป ดังนี้

1. วัคซีนโรต้า

- วัคซีน Rotarix มีรูปแบบเป็นน้ำยาแขวนตะกอน บรรจุอยู่ในกระบอกยาปิดด้วยจุกยาง ขนาด 1.5 มิลลิเมตรต่อโดส กำหนดการให้วัคซีนจำนวน 2 โดส ที่อายุ 2 และ 4 เดือน
- วัคซีน Rotasil-Liquid, Rotavirus Vaccine, Live Attenuated (liquid) มีรูปแบบเป็นน้ำยาแขวนตะกอน บรรจุในแอมพูลพลาสติกพร้อมใช้ ขนาด 2.0 มิลลิเมตรต่อโดส กำหนดการให้วัคซีน จำนวน 3 โดส โดยให้ที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน
- วัคซีนโรต้าสามารถเริ่มให้ครั้งแรกได้ เมื่ออายุ 6 - 15 สัปดาห์ และครั้งสุดท้ายอายุไม่เกิน 8 เดือน โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ อาจพิจารณาให้ในเด็กอายุมากกว่าที่กำหนดได้ แต่อายุต้องไม่เกิน 2 ปี (ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก) โดยควรอธิบายความเสี่ยงเรื่องลำไส้กลืนกันให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ
- วัคซีนโรต้าทุกชนิด ให้โดยวิธีรับประทานเท่านั้น ห้ามนำไปฉีดเป็นอันตราย
- ควรใช้วัคซีนชนิดเดียวกันจนครบ แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนโรต้าทุกชนิดสามารถสลับเปลี่ยนวัคซีนได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้วัคซีนต่างชนิดกันในแต่ละครั้ง หรือไม่ทราบชนิดวัคซีนที่ได้รับในครั้งก่อน ต้องให้วัคซีนทั้งหมด 3 ครั้ง (เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน)
- สามารถให้วัคซีนโรต้าร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดกินได้
- ห้ามใช้วัคซีนชนิดนี้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง severe combined immune deficient (SCID) ในเด็กที่มีประวัติลำไส้กลืนกันหรือมีประวัติแพ้วัคซีนชนิดรุนแรง
- วัคซีนโรต้าทุกชนิด เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นแสง และห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

2. การบริหารจัดการวัคซีน


องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการจัดส่งวัคซีน "Rotarix" ไปยังโรงพยาบาลจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด จากนั้นจะจัดส่งวัคซีน "Rotasiil" ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในการตรวจสอบการใช้วัคซีนของหน่วยบริการลูกข่าย และปรับค่า Reorder Point (ROP) ให้เหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันกรณีวัคซีนมีไม่เพียงพอในการให้บริการ หรือมีปริมาณคงคลังมากเกินไปจนความจำเป็นภายในคลังวัคซีนของโรงพยาบาล จึงขอให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

2.1 การปรับค่า ROP สามารถดำเนินการออนไลน์ผ่านระบบ VMI (เว็บไซต์ <http://scm.gpo.or.th/vmiX>) ที่เมนู FM3 EPI Routine เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนุมัติแล้ว ระบบจะปรับเป็นค่า ROP ใหม่โดยอัตโนมัติ

2.2 หากปริมาณวัคซีนที่ได้รับไม่เพียงพอ หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปรับ ROP หน่วยบริการสามารถขอเบิกวัคซีนเพิ่มเติมผ่านระบบ VMI (เว็บไซต์ <http://scm.gpo.or.th/vmiX>) ที่เมนู "เบิกวัคซีนเพิ่ม" ตามคู่มือการใช้งานระบบ VMI วัคซีน EPI Routine สำหรับหน่วยบริการ โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สปสช. (ปรับปรุง ก.พ. 2564)

ข้อมูลอื่น ๆ ของวัคซีน Rotasiil

รายการ	รายละเอียด
ชื่อวัคซีน	ROTASIIL (ชนิดหยอด 3 ครั้ง)
รหัส 24 หลัก	210070208027002730881178
รหัส GPU	1317951
รหัส TPU	1317979



ภาพ: บรรจุภัณฑ์และวัคซีน ROTASIIL (ชนิดหยอด)

ชื่อและรหัสวัคซีนสำหรับใช้บันทึกและส่งออกข้อมูลการให้บริการวัคซีนโรค

ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	รหัสวัคซีน	รหัสส่งออก	รหัส ICD-10- TM	อายุที่ได้รับ วัคซีน (เดือน)
วัคซีนชนิดหยอด 2 ครั้ง					
RV2-1	โรค 2-1	R11	R11	Z25.8	2 เดือน
RV2-2	โรค 2-2	R12	R12	Z25.8	4 เดือน
วัคซีนชนิดหยอด 3 ครั้ง					
RV3-1	โรค 3-1	R21	R21	Z25.8	2 เดือน
RV3-2	โรค 3-2	R22	R22	Z25.8	4 เดือน
RV3-3	โรค 3-3	R23	R23	Z25.8	6 เดือน